

基礎インスリン（例：トレシーバ）を使用中的方へ 1週間に1回投与の**アウिकリ注**のご案内



アウिकリ®注の注入器には、アウिकリ®注専用のフレックスタッチ®が使われています。

アウिकリ®注のフレックスタッチ®の
1目盛は10単位です。



アウिकリ®注フレックスタッチ® 総量300単位はカートリッジの途中までしか薬液が充填されていません。



アウिकリとは？ 1週間分のインスリンを1回で注射できます。毎日投与の基礎インスリンよりも高い濃度でできており、1回あたりに投与する液量はわかりません！！

2025年11月末までは、2週間毎の受診が必要です。

半分しか入っていないと心配しなくて も大丈夫です。
総量**300**単位は**6**週間、総量**700**単位は**12**週間以内の使用期限があります。



注射を忘れた場合の対処法


注射を忘れた場合は、気づいた時点で直ちに注射してください。その次の注射は4日間以上の間隔をあけてから行い、その後は新たな開始日と同じ曜日に注射してください。

例) 月曜日の注射を忘れた場合

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
	注射忘れ				忘れた分を注射	
8	9	10	11	12	13	14
			新たな開始日			
15	16	17	18	19	20	21
			注射日			

その後は新たな開始日と同じ曜日に注射してください。

アウिकリ®注投与による血糖値の推移(イメージ図)



投与後2、3日目に低血糖が起こりやすいため血糖に注意しましょう。

アウिकリがお勧めな人

- ・初めてのインスリン治療の方
- ・毎日のインスリンを打ち忘れる人
- ・注射の介助が必要で注射負担が大きい人（在宅介護・施設など）
- ・忙しく、毎日基礎インスリンを打つことが負担と感じ、なるべく注射回数を減らしたい方

アウिकリは非推奨

- ・日によって基礎インスリンの調整が必要な方
- ・日による活動量にばらつきが大きい方
- ・月経周期によってインスリン単位数の調整が必要な女性の方
- ・理解力が低下しており、誤って毎日打つ恐れのある方（認知症など）新しい針を装着することが推奨されます
- ・注射の針を換えない方（濃度が高く、注射間隔が1週間と長いため、針詰まりの可能性が高くなり、注射後注射針を破棄し

興味がある方は医師看護師にお尋ねください。

文責 看護師 齋木 糖尿病専門医 高部